

SOINS

/ Nettoyant

2 mois sérum physiologique 2 fois par jour, devant et derrière le piercing.

Bain de bouche 2 fois par jour / sans alcool et antiseptique (Extril)

Alimentation

Pas trop chaud

Trop dur

Trop vinaigré

Trop pimenté

CONTRE INDICATIONS (3 semaines)

Ne pas jouer avec

Ne pas tirer la langue

Ne pas toucher avec les doigts

Pas de rapports buccal

EN CAS DE DOUTE

Si un excès de douleur, de tuméfaction, de saignement, ou de changement de couleur persistant, n'enlevez surtout pas votre bijou.

Contactez-nous sans hésitation dès le moindre doute. Nous assumons gratuitement le suivi de la cicatrisation de votre piercing.

PROBLÈMES SOLUTIONS

/ Infection

La zone est gonflée, sensation de chaleur, la douleur se localise au niveau de l'oreille et redescend jusqu'à la mâchoire et des ganglions se forment en- dessous de la gorge.

Prendre rendez-vous chez le médecin, n'enlevez pas le bijou même si le médecin peut le demander car la plaie serait plus ouverte et risquerait de s'infecter.

/ Perte de bijou (barre ou bille)

Vous avez perdu la bille ou la barre.

Si vous avez perdu la bille mais que la barre est encore là mettez du sparadrap en attendant de passer à la boutique.

Si vous avez perdu la barre l'idéal est de mettre un bijou de bijouterie en attendant de passer à la boutique.

/ Point de compression

Suite à des chocs ou des pressions il est possible que la langue gonfle tellement que la barre va comprime.

Passez à la boutique nous mettrons gratuitement une barre plus grande afin que le piercing respire et que l'oreille dégonfle. Une fois que l'oreille aura bien dégonflée, vous devrez repasser à la boutique pour que nous puissions remettre la prothèse d'origine.

REVENIR DANS 3 SEMAINES

SOINS

/ Nettoyant

2 mois sérum physiologique 2 fois par jour, devant et derrière le piercing.

Savon PH neutre (Intima, Saphorel...) Pendant la douche 1 fois par jour.

ATTENTION

aux chocs / pièges courants
aux serviettes de bain après la douche
aux brosses à cheveux
aux vêtements
aux casques de moto

CONTRE-INDICATIONS
(1 mois et demi)

BAIGNADE
SPA
POUSSIÈRE
ANIMAUX
CASQUE DE MUSIQUE
/ ÉCOUTEURS
TÉLÉPHONE PORTABLE
TOUCHER LA ZONE

EN CAS DE DOUTE

Si un excès de douleur, de tuméfaction, de saignement, ou de changement de couleur persistant, n'enlevez surtout pas votre bijou.

Contactez-nous sans hésitation dès le moindre doute. Nous assumons gratuitement le suivi de la cicatrisation de votre piercing.

PROBLÈMES SOLUTIONS

/ Infection

La zone est gonflée, sensation de chaleur, la douleur se localise au niveau de l'oreille et redescend jusqu'à la mâchoire et des ganglions se forment en- dessous de la gorge.

Prendre rendez-vous chez le médecin, n'enlevez pas le bijou même si le médecin peut le demander car la plaie serait plus ouverte et risquerait de s'infecter.

/ Perte de bijou (barre ou bille)

Vous avez perdu la bille ou la barre.

*Si vous avez perdu la bille mais que la barre est encore là mettez du sparadrap en attendant de passer à la boutique.
Si vous avez perdu la barre l'idéal est de mettre un bijou de bijouterie en attendant de passer à la boutique.*

/ Point de compression

Suite à des chocs ou des pressions il est possible que l'oreille gonfle tellement que la barre va comprimer l'oreille. Dans ce cas précis, l'oreille est douloureusement gonflée, la barre ne dépasse plus mais la douleur est uniquement sur l'oreille. Mettre du sérum physiologique froid sur la zone.

Passez à la boutique nous mettrons gratuitement une barre plus grande afin que le piercing respire et que l'oreille dégonfle. Une fois que l'oreille aura bien dégonflée, vous devrez repasser à la boutique pour que nous puissions remettre la prothèse d'origine.